

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
13 octobre 2005 (13.10.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2005/094581 A1**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :  
**A01N 43/16**, C05F 11/00, 11/10

(74) Mandataires : **HUBERT, Philippe** etc.; Cabinet BEAU  
DE LOMENIE, 158 Rue de l'Université, F-75340 PARIS  
Cedex 07 (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2005/000764

(81) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22) Date de dépôt international : 30 mars 2005 (30.03.2005)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
0403267 30 mars 2004 (30.03.2004) FR

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Déposant (*pour tous les États désignés sauf US*) : **COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER** [FR/FR]; 27 Avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MALO (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (*pour US seulement*) : **BRIAND, Xavier** [FR/FR]; 10 Rue Pors Gwen Kermouster, F-22740 LEZARDRIEUX (FR). **CLUZET, Stéphanie** [FR/FR]; 58 Boulevard des Minimes,, Appartement 20 Bâtiment A, F-31200 TOULOUSE (FR). **DUMAS, Bernard** [FR/FR]; 29 Rue de la Gimone, F-31850 MONTRABE (FR). **ESQUERRE-TUGAYE, Marie-Thérèse** [FR/FR]; 11 Chemin du Château d'eau, F-31320 CASTANET-TOLOSAN (FR). **SALAMAGNE, Sylvie** [FR/FR]; 2 Allée des 9 Muses, F-77410 GRESSY EN FRANCE (FR).

**Publiée :**

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: USE OF ULVANS AS ELICITORS OF MECHANISMS FOR NITROGEN ABSORPTION AND PROTEIN SYNTHESIS

(54) Titre : UTILISATION DES ULVANES COMME ELICITEURS DES MECANISMES D'ABSORPTION DE L'AZOTE ET DE LA SYNTHÈSE PROTÉIQUE.

(57) Abstract: The invention relates to the use of ulvans, such as extracts of green algae of the genera *Ulva* or *Enteromorpha*, or oligosaccharides derived from ulvans, as elicitors of mechanisms for nitrogen absorption and protein synthesis. The invention also relates to a fertiliser product containing ulvans and to the use thereof in a plant treatment method.

(57) Abrégé : La présente invention concerne l'utilisation des ulvanes, notamment extraits d'algues vertes du genre *Ulva* ou *Enteromorpha*, ou d'oligosaccharides dérivés d'ulvanes, comme éliciteurs des mécanismes d'absorption de l'azote et de la synthèse protéique. Elle concerne également un produit fertilisant contenant des ulvanes et son utilisation dans un procédé de traitement des plantes.



**WO 2005/094581 A1**

**Utilisation des ulvanes comme éliciteurs des mécanismes d'absorption de l'azote et de la synthèse protéique.**

La présente invention, qui trouve application dans le domaine  
5 agricole, a essentiellement pour objet l'utilisation des ulvanes, notamment extraits d'algues vertes du genre *Ulva* ou *Enteromorpha*, ou d'oligosaccharides dérivés d'ulvanes, comme éliciteurs des mécanismes d'absorption de l'azote et de la synthèse protéique.

La présente invention a également pour objet des compositions  
10 fertilisantes telles que, par exemple, des engrais contenant ces ulvanes ou oligosaccharides dérivés d'ulvanes ainsi qu'un procédé de traitement des plantes ou des sols les utilisant.

Dans le cadre de la présente description, on entend désigner par l'expression « composition fertilisante » tout produit dont l'emploi est  
15 destiné à assurer ou à améliorer les propriétés physiques, chimiques ou biologiques des sols ainsi que la nutrition des végétaux.

Une telle composition peut être, par exemple, un engrais appliqué par voie racinaire ou par voie foliaire.

On sait que les engrais se définissent comme des matières  
20 fertilisantes dont la fonction principale est d'apporter aux plantes des éléments directement utiles à leur nutrition (éléments fertilisants majeurs, éléments fertilisants secondaires et oligo-éléments).

A cet effet, les engrais racinaires ou foliaires utilisent généralement des sources d'azote, de phosphore et de potassium ainsi que des oligo-  
25 éléments et des acides aminés.

Les plantes absorbent principalement l'azote, qui est un élément nutritif essentiel à leur croissance.

L'azote est généralement apporté sous la forme de nitrate ou d'ammonium dont l'utilisation en grande quantité pose des problèmes sur  
30 le plan écologique.

Une des réponses possibles aux effets indésirables de la fertilisation par les nitrates consiste à améliorer l'efficacité de l'absorption de l'azote et de son assimilation, c'est-à-dire son incorporation dans les molécules organiques et notamment dans les protéines.

35 Pour être absorbé par la plante l'azote minéral doit traverser les parois et les membranes cellulaires. Le passage de la membrane, qui

entoure la cellule, constitue l'étape déterminante du contrôle par la plante de sa nutrition minérale.

A ce stade, les mécanismes d'entrée de l'azote dans la plante sont contrôlés par des transporteurs.

5 Par la suite, l'ammonium issu de la réduction du nitrate ou absorbé directement par les racines ou la feuille est intégré aux molécules organiques pour donner la glutamine et le glutamate. Ces deux réactions sont catalysées par la glutamine synthase et la glutamate synthétase. Ces enzymes peuvent être considérées, dans certaines conditions, comme  
10 facteurs limitants de l'assimilation de l'azote.

L'ammonium apparaît donc comme un intermédiaire essentiel du métabolisme azoté de la plante.

Cet azote est ensuite transféré à d'autres molécules pour former les acides aminés. Le matériel carboné constitutif des acides aminés et  
15 l'énergie nécessaire au déroulement de ces réactions sont fournis par la photosynthèse et la respiration.

La synthèse des acides aminés a lieu principalement dans les chloroplastes. L'assimilation du CO<sub>2</sub> fournit le squelette carboné nécessaire à la synthèse des acides aminés.

20 A ce niveau, différentes enzymes comme l'énolase, la citrate synthase ainsi que l'isocitrate déshydrogénase jouent un rôle clé dans la production des précurseurs d'acides aminés obtenus à partir de la transformation du 3-phosphoglycérate produit lors de la photosynthèse.

La triosephosphate isomérase est responsable de l'étape de  
25 transformation du glyceraldéhyde phosphate en dihydroacétone phosphate. Le dihydroacétone phosphate exporté du chloroplaste représente non seulement un important précurseur de la synthèse des sucres mais aussi un métabolite de transport pour l'énergie et les équivalents réducteurs. Le dihydroacétone phosphate est à disposition  
30 pour des synthèses (saccharose, protéosynthèse) ou se transforme en 3 phospho-D-glycérate en transférant son énergie à l'ADP et son hydrogène au NAD<sup>+</sup> nécessaires au métabolisme cellulaire et notamment à la synthèse de glutamine et la glutamate.

35 Les peroxydases sont, quant à elles, connues pour leur implication dans la croissance, via leur activité sur la division cellulaire. Les enzymes glutathion peroxydase et superoxyde dismutase permettent ainsi de

maintenir une forte activité photosynthétique en assurant une bonne détoxification des radicaux libres produits au cours de ce processus.

Il est connu que la synthèse ou l'activité des transporteurs et des différentes enzymes impliqués dans ces mécanismes peuvent varier en  
5 réponse à un certain nombre de signaux, qu'ils soient externes (lumière, apport d'azote, substances chimiques, ...) ou internes (rythme circadien). Ainsi, pour augmenter la capacité de réponse à la fertilisation azotée en termes d'absorption de l'azote minéral, de croissance et de production de protéines d'une plante, une des stratégies possibles consiste à stimuler  
10 préalablement les réactions liées aux métabolismes azoté et carboné par l'utilisation de molécules signaux.

Les algues marines constituent une ressource végétale abondante et sont, depuis longtemps, utilisées sur les régions côtières comme fertilisants du sol. La germination des graines, l'obtention de meilleurs  
15 rendements, une résistance aux maladies, une durée de conservation plus longue des fruits ont été mis en évidence par suite de traitements de plusieurs plantes par des extraits d'algues. Les conclusions en matière de croissance et de santé des plantes avaient essentiellement été attribuées à la richesse en bétaines, en phytohormones et en oligo-éléments des  
20 algues utilisées.

C'est dans ce contexte qu'il a été découvert, et ceci constitue le fondement de la présente invention, que les ulvanes notamment extraits d'algues vertes et les oligosaccharides dérivés de ces derniers permettent de façon tout à fait surprenante et inattendue de stimuler l'expression des  
25 gènes du métabolisme azoté (transporteur d'ammonium, nitrite réductase, glutamate synthase et glutamine synthétase) ainsi que certains gènes du métabolisme carboné, notamment impliqués dans l'apport de matériel carboné nécessaire à la synthèse des acides aminés. Cette forte activité métabolique est soutenue par une stimulation des processus de division  
30 cellulaire (peroxydases) et une bonne activité détoxifiante nécessaire au contrôle de la surproduction de radicaux libres générés par une forte activité photosynthétique.

Ces ulvanes peuvent donc être utilisés en complément dans des compositions fertilisantes, telles que des engrais, comme activateurs de  
35 l'absorption de l'azote minéral et de son assimilation sous forme de protéines.

De telles compositions permettent une production d'azote organique accrue répondant aux besoins de croissance de la culture, qui s'exprimera notamment en terme d'amélioration de rendement. Ces compositions permettent également une augmentation de la teneur en protéines et de la valeur nutritionnelle des protéagineux et des fourrages.


Ces compositions permettent encore de réduire les risques de toxicité provoquée par une accumulation excessive d'ions ammonium au niveau foliaire ou de réduire les accumulations de nitrates dans les feuilles.

Ainsi, selon un premier aspect, la présente demande vise à couvrir l'utilisation des ulvanes, notamment extraits d'algues vertes du genre *Ulva* ou *Enteromorpha*, ou d'oligosaccharides dérivés d'ulvanes, comme éliciteurs des mécanismes d'absorption de l'azote et de la synthèse protéique.

Les ulvanes utiles selon l'invention sont des polysaccharides hydrosolubles présents notamment dans les parois cellulaires des algues vertes des genres *Ulva* et *Enteromorpha*.


Les ulvanes se définissent plus précisément comme des polysaccharides acides fortement sulfatés et sont essentiellement composés d'unités dérivées de rhamnose 3-sulfate, de xylose, de xylose 2-sulfate, d'acide glucuronique et d'acide iduronique.

Les quatre unités récurrentes suivantes sont notamment caractéristiques des ulvanes :



**>4)-  $\beta$ -D-GlcA- (1>4)-  $\alpha$ -L-Rha 3 sulfate(1>**


(encore dénommé acide ulvanobiouronique 3-sulfate type A)



**>4)- α-L-IdoA- (1>4)- α-L-Rha 3 sulfate(1>**

(encore dénommé acide ulvanobiuronique 3-sulfate type B)


5



**>4)- β-D-Xyl- (1>4)- α-L-Rha 3 sulfate(1>**

(encore dénommé acide ulvanobiose 3-sulfate)

10



**>4)- β-D-Xyl 2 -sulfate- (1>4)- α-L-Rha 3 sulfate(1>**

(encore dénommé acide ulvanobiose 2',3-disulfate)

15

Les ulvanes représentent entre 5 et 20% du poids sec de l'algue. Leur poids moléculaire varie entre 90000 et 500000 g.mol<sup>-1</sup> chez les genres *Ulva* et *Enteromorpha*.

Avantageusement, les ulvanes utilisés selon la présente invention sont extraits d'algues choisies dans le groupe constitué des espèces suivantes : *Ulva armoricana*, *Ulva rigida*, *Ulva rotundata*, *Ulva lactuca*, *Enteromorpha intestinalis* et *Enteromorpha compressa*.

20

Des extraits d'algues riches en ulvanes susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la présente invention peuvent être obtenus à partir des espèces d'algues précitées par un procédé comportant généralement les étapes suivantes : lavage, broyage, extraction (séparation solide-liquide) et éventuellement fractionnement et concentration.

L'extrait obtenu peut être plus ou moins concentré selon l'utilisation envisagée. Une déshydratation totale de cet extrait permettant une présentation sous forme pulvérulente hydrosoluble peut être obtenue, par exemple, par sécheur à tambour ou par atomisation.

Les oligosaccharides dérivés d'ulvanes susceptibles d'être utilisés dans le cadre de l'invention peuvent être obtenus par hydrolyse acide ou enzymatique, à partir des extraits précités.

Les conditions d'extraction et la nature des algues seront choisies de telle façon que l'extrait obtenu présente la concentration souhaitée dans l'application envisagée. Ces choix pourront être facilement réalisés par l'homme du métier notamment en tenant compte des indications générales qui vont suivre.

D'une façon générale la quantité d'ulvanes ou d'oligo-saccharides dérivés d'ulvanes apportée aux plantes est de 0,1 g à 100 g par litre et préférentiellement de l'ordre de 1 g par litre pour les apports sous forme liquide en foliaire ou dans les solutions nutritives racinaires (hydroponie, goutte à goutte, ...) ou bien encore de 10 à 1000 g/ha et de préférence de l'ordre de 200 g/ha pour les apports sous forme solide dans les engrais pulvérulents ou granulés.

La quantité d'ulvanes apportée aux plantes doit être suffisante pour stimuler l'expression des gènes impliqués dans l'éllicitation des mécanismes d'absorption de l'azote et de la synthèse protéique. Cette quantité est variable selon la nature de la plante à traiter et le mode de traitement (voie foliaire ou voie racinaire). Cette quantité pourra notamment être déterminée au cas par cas par la mise en œuvre de tests macroarrays tels que définis ci-dessous.

Selon un deuxième aspect, la présente demande vise à protéger un procédé de traitement des plantes ou des sols destiné à activer les réactions d'éllicitation des mécanismes d'absorption de l'azote et de la synthèse protéique, caractérisé en ce qu'il comprend l'application auxdites plantes ou aux sols d'une quantité efficace d'ulvanes, notamment extraits

d'algues vertes du genre *Ulva* ou *enteromorpha*, ou d'oligosaccharides dérivés d'ulvanes.

Avantageusement, l'application aux plantes sera réalisée par voie foliaire ou par voie racinaire.

- 5           La quantité efficace d'ulvanes ou d'oligo-saccharides dérivés d'ulvanes apportée aux plantes est de 0,1 g à 100 g par litre et préférentiellement de l'ordre de 1 g par litre pour les apports sous forme liquide en foliaire ou dans les solutions nutritives racinaires (hydroponie, goutte à goutte, ...) ou bien encore de 10 à 1000 g/ha et  
10           préférentiellement de l'ordre de 200 g/ha pour les apports sous forme solide dans les engrais pulvérulents ou granulés.

- A titre d'exemples de produits fertilisants conformes à l'invention, on citera les amendements calcaires, les amendements organiques et les supports de culture, les engrais racinaires de type NP, PK, NPK, etc., les  
15           engrais foliaires ou encore les solutions nutritives racinaires.

- Les substances fertilisantes susceptibles d'être utilisées en association avec les ulvanes ou les oligosaccharides dérivés d'ulvanes peuvent être de natures variées et choisies par exemple parmi l'urée, le sulfate d'ammonium, le nitrate d'ammonium, le phosphate naturel, le  
20           chlorure de potassium, le sulfate d'ammonium, le nitrate de magnésium, le nitrate de manganèse, le nitrate de zinc, le nitrate de cuivre, l'acide phosphorique, l'acide borique.

La présente invention trouve application dans le traitement d'une très grande variété de plantes.

- 25           Parmi celles-ci, on citera en particulier :  
          - les plantes de grande culture telles que les céréales (blé, maïs),  
          - les protéagineux (pois),  
          - les oléagineux (soja, tournesol),  
30           - les plantes prairiales utiles pour l'alimentation animale,  
          - les cultures spécialisées telles qu'en particulier le maraîchage (laitue, épinards, tomate, melon), la vigne, l'arboriculture (poire, pomme, nectarine), ou l'horticulture (rosiers).

- Par l'expression "plante" on entend désigner dans la présente  
35           demande la plante considérée dans son ensemble, incluant son appareil racinaire, son appareil végétatif, les graines, semences et fruits.



La présente invention sera maintenant illustrée par les exemples non limitatifs suivants.

Dans ces exemples, et sauf indication contraire, les pourcentages sont exprimés en poids et la température est la température ambiante.

5

**EXEMPLE 1 – Procédé de préparation d'un extrait d'algue riche en ulvanes utilisable dans le cadre de l'invention**

**A – Description générale**

10

**a) Préparation des ulvanes**

La fraction d'ulvanes est obtenue par extraction aqueuse d'algues fraîches (100 g d'algues fraîches par litre d'eau).

L'extraction est réalisée sous agitation à 90 °C, pendant 2 heures.

15 L'extrait est ensuite filtré sur une membrane (80 µm de porosité). Le solvant (eau) est évaporé pour obtenir une poudre hydrosoluble.

**b) Préparation des oligoulvanes**

20 Les ulvanes préparés comme indiqué en a) ci-dessus sont hydrolysés dans 1 litre de solution acide (acide trichloroacétique ou acide chlorhydrique concentré à 2-3 mol l<sup>-1</sup>) à 100 °C pendant 30 mins à 1 h, préférentiellement de l'ordre de 40 mins.

L'acide glucuronique, l'acide aldobiuronique, l'ulvanobiouronate et l'acide iduronique ont été identifiés dans les produits d'hydrolyse.

25

**B. Exemple détaillé d'extraction :**

Un extrait d'*Ulva armoricana* enrichi en ulvanes et, en particulier, en dérivés d'acide iduronique de type xyloidurorhamnane a été obtenu en suivant le protocole expérimental suivant :

30

**a) Lavage**

Des algues fraîches de type *Ulva armoricana* sont soumises à deux lavages successifs dans un bac d'eau afin d'éliminer le sable et les graviers.

35

Les algues sont ensuite déposées dans des paniers grillagés en inox avant d'être introduites dans des bacs où elles sont recouvertes d'eau.

Une agitation par des buses d'aération permet de maintenir les algues en suspension en favorisant ainsi la décantation des impuretés.

b) Broyage

- 5 Les algues, ainsi lavées, sont égouttées puis broyées en morceaux de 1 à 10 mm.

c) Extraction

- 10 1000 kg d'algues sont dispersés dans un réacteur chauffant contenant 10000 kg d'une solution aqueuse portée à une température de 90°C. L'ensemble est maintenu à cette température pendant une durée d'environ 2 heures.

- 15 Préalablement à l'extraction, les cellules algales déjà broyées sont micro-éclatées au moyen d'un homogénéisateur de type ULTRA-TURAX® afin de favoriser l'extraction. L'opération de séparation intervient à l'issue des 2 heures d'extraction.

d) Séparation

- 20 La fraction soluble, riche en dérivés d'acide iduronique de type xyloïdurorhamnane, est séparée des débris d'algues par centrifugation (séparation solide-liquide).

L'extrait centrifugé est ensuite filtré, soit sur un filtre à terre de diatomées, soit sur un filtre à plateaux, puis à nouveau filtré sur une membrane jusqu'à 1 µm.

- 25 Le filtrat ainsi obtenu comprend entre 0,1 et 1 % en poids d'extrait sec.

L'extrait ainsi préparé peut être utilisé sous une forme plus ou moins concentrée, la concentration finale étant déterminée en fonction de la teneur recherchée en dérivés actifs dans l'application envisagée.

- 30 Ainsi, le filtrat mentionné précédemment peut être concentré, par exemple, au moyen d'un évaporateur à flot tombant, de façon à ce que l'extrait sec représente de 10 à 60 % en poids de celui-ci.

- 35 Une déshydratation totale peut également être obtenue, par exemple, par sécheur à tambour ou par atomisation lorsque l'on recherche une présentation sous forme pulvérulente hydrosoluble.

En procédant comme décrit ci-dessus, on a préparé divers extraits à partir de six espèces d'algues vertes des genres *Ulva* ou *Enteromorpha*. La composition de ces extraits secs est présentée dans les tableaux 1A et 1B ci-après.

5

TABLEAU 1A : Composition des extraits d'algues vertes

Algue	% d'ulvanes (% du poids sec de l'algue)	% de sucres totaux	% de sulfates	% de protéines
<i>Ulva armoricana</i>	7-15	50-80	10-20	3-7
<i>Ulva rigida</i>	5-18	50-80	13-17	1-10
<i>Ulva rotundata</i>	6-15	50-70	10-20	1-10
<i>Ulva lactuca</i>	5-17	50-70	10-20	1-8
<i>Enteromorpha intestinalis</i>	5-15	45-75	15-20	1-10
<i>Enteromorpha compressa</i>	5-16	50-75	10-20	1-12

TABLEAU 1B : Composition en oses et en acides uroniques des extraits d'algues vertes

10

Algue	Rha	Gal	Glc	Xyl	GlcA	IdoA
<i>Ulva armoricana</i>	45-50	1-4	5-20	6-15	15-25	5-15
<i>Ulva rigida</i>	50-60	0,5-2	5-8	5-15	18-35	2-5
<i>Ulva rotundata</i>	45-55	1-3	5-15	5-25	16-30	0,5-5
<i>Ulva lactuca</i>	45-60	0,5-5	2-6	1-10	15-25	2-5
<i>Enteromorpha compressa</i>	25-50	1-5	2-10	5-15	10-20	5-10
<i>Enteromorpha intestinalis</i>	30-50	1-4	1-5	6-15	15-20	5-10

## **EXEMPLE 2**

### 15 **A - Effets des ulvanes sur l'expression des gènes d'une plante modèle**

Une analyse globale de l'expression de nombreux gènes impliqués dans la défense d'une plante modèle a été réalisée en faisant appel aux techniques de génomique fonctionnelle. La légumineuse *Medicago*

*truncatula* (nombre important de séquences d'ADN disponibles) a été utilisée comme plante modèle.

On a ainsi étudié l'effet des ulvanes sur plus de 25 gènes impliqués dans le métabolisme azoté et carboné, ainsi que dans les processus oxydatifs liés à la division cellulaire de cette plante modèle par analyse  
5 macroarray.

### a) Matériel biologique

Des plantes de *Medicago truncatula* lignée F83 005.5 sont cultivées  
10 dans un environnement contrôlé (16h / 8h, 20°C / 15°C, 60 % humidité).

Les produits étudiés ont été apportés, soit par voie foliaire, soit par voie racinaire.

Dans le cas de l'apport foliaire, les différentes solutions d'éliciteurs sont pulvérisées sur les feuilles des plantes âgées de 1 mois à la  
15 concentration de 1 mg/mL.

Dans le cas de l'apport racinaire les produits sont introduits dans le milieu nutritif.

L'étude de l'expression globale des gènes potentiellement impliqués dans le métabolisme et dans la signalisation a été poursuivie par  
20 macroarray.

### b) Préparation des Macroarrays

Une sélection d'étiquettes de gènes exprimés (EST) de *Medicago truncatula* basée essentiellement sur leurs implications dans le  
25 métabolisme primaire est réalisée en utilisant les bases de données TGIR et MENS.

Des EST appartenant aux séquences de *Medicago truncatula* [Tentative consensus sequences (TC)] sont récupérées des librairies MtBA, MtBB et MtBC.

30 Deux fragments génomiques (TC85619, TC85808) sont amplifiés par PCR utilisant l'ADN génomique de *Medicago truncatula* comme amorce. Ces 2 ESTs sont ensuite clonés en pGEM-Teasy vector (Promega) et vérifiés par séquençage.

Les autres fragments d'ADN sont amplifiés par PCR en utilisant les  
35 amorces universelles complémentaires aux séquences vecteurs encadrant le site de clonage des ADN. Les produits d'amplification sont analysés par

électrophorèse et sont ajustés à 0,2-0,5 µg/µL avec du DMSO (50%) et déposés sur une membrane à l'aide d'un robot (Eurogridder spotting robot).

5 **c) Résultats**

L'activité des ulvanes d'algues conformément à l'exemple 1 a été étudiée en suivant l'expression, de façon simultanée, d'une trentaine de gènes. Les différentes catégories d'ESTs sélectionnées sont classées par famille : métabolisme azoté, métabolisme carboné et processus oxydatifs.

- 10 Les extraits d'algues vertes riches en ulvanes entraînent l'induction de 5 à 7 gènes potentiellement impliqués dans le métabolisme primaire. Des réponses similaires sont obtenues pour les 2 types d'apport, i.e. foliaire et racinaire. L'induction des gènes est plus importante pour les ulvanes riches en dérivés d'acide xyloïdurorhamnane, comme par exemple
- 15 les ulvanes d'*Ulva armoricana* et d'*Enteromorpha intestinalis*. Les oligoulvanes obtenus après hydrolyse présentent des résultats identiques.

TABLEAU 2C : Effets des ulvanes de différentes algues vertes sur l'expression de certains gènes en macroarrays

Famille de gènes	Nombre de TC <sup>1</sup>	Ulva				Enteromorpha		
		U. armoricana <sup>2</sup>		U. rigida	U. rotundata	U. lactuca	E. compressa	E. intestinalis
		Ulvanes	Oligo-ulvanes					
Processus oxydatifs	8	2	2	2	1	2	1	
Métabolisme azoté	6	2	2	1	1	1	2	
Métabolisme carboné	19	3	3	2	4	3	3	
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

<sup>1</sup> Les valeurs correspondent au nombre de TC (TIGR Tentative Consensus Sequence) dans chaque famille de gènes.

<sup>2</sup> Les valeurs sont des moyennes de 3 traitements indépendants correspondant au nombre de gènes.

#### d) Influence du nombre de traitements sur la sensibilisation de la plante

Une deuxième série d'expérimentations a été réalisée pour évaluer l'effet de la sensibilisation de la plante traitée avec l'extrait d'*Ulva armoricana*. L'effet d'un second traitement avec l'extrait d'*Ulva armoricana*, 3 jours après la première pulvérisation, a ainsi été évalué. Les effets sur l'expression des gènes sont étudiés par macroarray.

Les traitements en un ou deux apports induisent l'expression d'un grand nombre de gènes impliqués dans les métabolismes primaire et de signalisation. Les traitements induisent l'expression de gènes dans toutes les catégories fonctionnelles.

Dans le cas du métabolisme azoté, un traitement unique permet de stimuler l'expression de la glutamine synthétase et de la glutamate déshydrogénase. Un double traitement permet de doubler le nombre de gènes exprimés avec notamment une surexpression des gènes codant pour le transporteur d'ammonium, la nitrite réductase, la glutamate synthase et la glutamine synthétase.

Dans le cas du métabolisme carboné, un traitement unique permet de stimuler les gènes codant l'énolase, la triosephosphate isomérase et l'isocitrate déshydrogénase. Un double traitement induit la surexpression des gènes codant l'énolase phosphatase et la citrate synthase.

Dans le cas des processus oxydatifs, on observe l'induction de l'expression de différents gènes codant différentes enzymes : ascorbate peroxidase, peroxydase, superoxide dismutase, glutathione peroxydase ou glutathion S-transférase.

TABLEAU 2D : Effets des ulvanes de *Ulva armoricana* sur l'expression de certains gènes en macroarrays

			Traitement <sup>a</sup>					
TC TIGR <sup>b</sup>	Fonction putative	Accession dans GB <sup>c</sup>	AV <sup>d</sup>			AV+AV <sup>e</sup>		
			1	2	3	1	2	3
<b><u>Processus oxydatifs</u></b>								
TC76384	ascorbate peroxydase	AL367369	1,60	2,40	1,00	0,90	0,74	NS
TC85974	peroxydase	AL371851	1,05	1,46	NS	2,77	5,38	2,69
TC76946	superoxyde dismutase	AL375556	2,49	3,12	1,00	1,40	NS	1,00
TC86106	glutathione peroxydase	AL374155	0,88	1,43	1,40	NS	2,08	1,90
TC85451	glutathione S-transférase	AL368847	1,00	1,16	1,00	1,15	1,55	3,01
TC87485	similaire à une germine	AL373691	NS	1,32	1,10	1,16	NS	NS

<b>Voie des sucres</b>								
TC77339	énolase-phosphatase	AL378849	1,00	0,93	NS	NS	1,79	2,09
TC85317	énolase	AL367711	1,93	1,75	1,43	NS	0,96	NS
TC85485	transkétole	AL373090	1,00	1,00	1,00	1,00	NS	1,00
TC85539	triosephosphate isomerase	AL365666	1,61	1,47	1,61	0,94	1,23	NS
TC85625	isocitrate déshydrogénase	AL368524	1,07	2,67	1,70	0,87	1,07	1,44
TC85966	citrate synthase	AL374303	1,00	NS	NS	1,59	2,44	2,24

<b>Voie de l'azote</b>								
TC76943	glutamine synthétase	AL366171	2,19	4,33	4,06	2,88	2,82	0,94
TC77277	nitrite réductase		0,84	NS	0,83	3,56	2,20	2,34
TC77553	glutamate synthase	AL366890	0,92	0,74	0,82	NS	2,28	1,97
TC86604	glutamate déshydrogénase	AL372216	1,00	1,51	2,21	1,00	NS	NS
TC87190	transporteur d'ammonium	AL370643	1,47	1,07	NS	NS	2,09	2,54

- 5 a : Valeurs correspondant aux rapports "intensités des signaux des plantes traitées par l'extrait d'*Ulva* (AV)" sur "intensités des signaux des plantes contrôles". Seuls les gènes induits (rapport > 1,5) dans au moins deux expériences indépendantes sont inclus. Lors de notre comparaison des réplicats des trois expériences, nous considérons que le rapport d'un seul gène ne doit pas être induit dans un réplicat et réprimé dans au moins un des autres, sinon il est considéré comme non significatif (NS).

- 10 b : TC TIGR, numéro de Tentative de Consensus selon The Institute of Genome Research.

c : GB, numéro d'accès dans Genbank.

d : AV, un seul traitement AV.

e : AV+AV, deux traitements AV consécutifs.

### 15 **EXEMPLE 3 – Effets des ulvanes sur l'absorption de l'azote minéral**

- 20 L'expérimentation est effectuée sur du blé. L'extrait d'ulvanes est apporté au sol à raison de 100 et 200 g/ha ou par voie foliaire à raison de 0,1 et 1g par litre en même temps qu'une fertilisation azotée (nitrate d'ammonium).

La coupe des blés et le pressage des bas de tige ont été réalisés le même jour, au stade épiaison - début sortie des étamines, une semaine après l'application. Le dosage de l'azote minéral est effectué sur le jus de sève.

- 25 L'ensemble des traitements en foliaire ou au sol montre un effet significatif sur l'absorption de l'azote minéral et confirme l'effet stimulant sur les gènes impliqués dans le transport de l'azote et notamment de l'ammonium.



TABLEAU 3 : Effets des ulvanes sur l'absorption d'azote minéral

	<b>Concentration d'ulvanes</b>	<b>Absorption d'azote minéral</b> (en % du témoin)
<i>Sol</i>	100 g /ha	+ 12 %
	200 g /ha	+ 24 %
<i>Voie foliaire</i>	0,1 g /L	+ 18 %
	1 g /L	+ 32 %

**EXEMPLE 4 – Effets des ulvanes sur la production de protéines**

5 L'expérimentation est réalisée sur du pois fourrager variété Solara et sur du maïs variété Sabrina. Les plantes sont cultivées en pots sur de la vermiculite dans un milieu nutritif de Hoagland.

L'extrait d'ulvanes est incorporé à la solution nutritive avant semis à la dose de 200 g/ha ou appliqué par pulvérisation foliaire à la dose de 1 g par litre. Les cultures sont conduites pendant 4 semaines pour le pois et 6 semaines pour le maïs. A ce stade, la teneur et la quantité de protéines produites par les appareils racinaire et foliaire sont déterminées.

Dans le cas de l'apport racinaire, on observe une augmentation de la teneur en protéines racinaires de 16% pour le pois et 18 % pour le maïs. L'amélioration du taux de protéines racinaires conjointement avec la stimulation de la biomasse racinaire entraîne une augmentation de la quantité totale de protéines racinaires produites par chaque plant : 27% pour le pois et 31% pour le maïs. Dans le même temps, le taux de protéines foliaires est augmenté de 12%, pour les 2 cultures.

Dans le cas de l'apport foliaire, l'augmentation du taux de protéines est de 15% pour le pois et de 16% pour le maïs.

Tableau 4 : Effets des ulvanes sur la production de protéines

<i>Cultures</i>	Type d'apport	<b>Taux de protéines racinaires</b> (en % du témoin)	<b>Taux de protéines foliaires</b> (en % du témoin)
<i>Pois</i>	<i>Sol</i>	+ 16 %	+ 12 %
	Pulvérisation foliaire	-	+ 15 %
<i>Maïs</i>	<i>Sol</i>	+ 18 %	+ 12 %
	Pulvérisation foliaire	-	+ 16 %

**EXEMPLE 5 – Effets des ulvanes sur la valorisation des réserves azotées du sol ainsi que sur l'efficacité de la fertilisation azotée.**

L'essai est réalisé sur du maïs variété Sabrina.

Les dérivés d'ulvanes sont appliqués au sol (200 g/ha) ou en  
5 pulvérisation foliaire (1 g par litre) en végétation.

L'action du produit est étudiée d'une part en situation optimale (N = 180 U) et d'autre part en situation pénalisante (absence de fertilisation azotée).

Le dispositif expérimental comprend des modalités à 4 répétitions.

10 Chaque parcelle élémentaire est constituée de 6 rangs de 12 m, avec récolte des 2 rangs centraux. Pour les parcelles bénéficiant d'une fertilisation azotée, l'apport se fait sous forme d'urée au moment du labour (60 U) et au stade 8 feuilles (120 U).

Les traitements racinaire et foliaire sont appliqués environ 1 mois  
15 après le semis, au stade 5-6 feuilles.

Les contrôles effectués sur les lots témoins et traités se font sur les éléments de rendement.

20 Tableau 5 : Effets des ulvanes sur l'expression du rendement du maïs, cultivé en conditions limitantes en azote.

Unités d'azote / ha	Traitement	Rendement à 15%		
		q/ha	Variation / témoin	
			q/ha	%
Dose 0	Témoin	109,45		
	Ulvanes au sol	121,80	+ 2,35	+ 11 %
	Ulvanes foliaire	130,57	+ 21,12	+ 20 %
Dose 180	Témoin	139,65		
	Ulvanes au sol	144,99	+ 5,34	+ 4 %
	Ulvanes foliaire	149,43	+ 9,78	+ 7 %

Les traitements ulvanes permettent une amélioration des rendements quelque soit la modalité.

25 Dans le cas de l'apport à 180 U, le rendement passe de 139,65 q/ha (quintaux par hectare) pour le témoin à 144,99 q/ha pour l'apport racinaire, soit une augmentation de rendement de plus de 5 q/ha.

Dans le cas de l'apport foliaire, le gain s'élève à plus de 9 q/ha soit une augmentation de 7 % du rendement.

Une situation plus pénalisante en azote favorise l'expression des traitements ulvanes en faveur du rendement. Le différentiel devient alors important avec un rendement qui passe de 109,45 q/ha pour le témoin à 121,8 q/ha pour l'apport racinaire, soit un gain de 12,35 q/ha. Ce gain correspond ainsi à une progression de plus de 11% du rendement. Dans le cas de l'apport foliaire, le gain s'élève à plus de 21,12 q/ha, soit une augmentation de 20 % du rendement.

Les traitements ulvanes permettent ainsi de réduire les effets dépressifs d'une situation pénalisante en azote. L'absence de fertilisation entraîne une chute du rendement de 30 q/ha entre les témoins, alors qu'elle n'est que de 9 q/ha entre le maïs traité (apport foliaire en absence de fertilisation azotée) et le témoin fertilisé (180 U).

15

#### **EXEMPLE 6 – Effets des ulvanes sur la réduction de l'accumulation de nitrates dans les feuilles**

Une culture de laitue est réalisée sur vermiculite avec un apport de solution azotée entraînant l'accumulation des nitrates dans les feuilles.

Au stade 4 feuilles, les plantules sont repiquées dans des pots contenant de la vermiculite imbibée d'une solution nutritive et de nitrates (20 méq N/L).

Dans le cas du traitement foliaire, les ulvanes sont pulvérisées sur les plantes 5 jours et 10 jours après le repiquage.

Dans le cas du traitement au sol, les ulvanes sont ajoutées directement dans la solution nutritive.

L'analyse des feuilles en nitrates est réalisée 20 jours après le repiquage.

Tableau 6 : Effets des ulvanes sur la réduction de l'accumulation de nitrates dans les feuilles

	Dose	Réduction de l'accumulation de $\text{NO}_3^-$ dans la feuille
<b>Apport foliaire</b>	0,1 g/L	- 12 %
	1 g/L	- 34 %
	10 g/L	- 36 %
<b>Apport au sol</b>	10 g/ha	- 6 %
	100 g/ha	- 18 %
	1000 g/ha	- 20 %

- 5 L'ensemble des traitements avec l'extrait d'ulvanes entraîne une réduction de l'accumulation des nitrates dans les feuilles de laitue. Elle varie de 12 à 36 % dans le cas du traitement foliaire et de 6 à 20 % dans le cas de l'apport au sol.

10 **EXEMPLE 7 – Exemples de formulations incorporant des ulvanes**

On donnera ci-après, à titre d'exemples, diverses formulations utilisables selon l'invention avec des indications sur les conditions de mise en œuvre de ces formulations.

15 **A – AMENDEMENTS**

a) AMENDEMENT CALCAIRE

Lithothamnium 1000 kg  
Dérivés d'ulvanes QSP 200 g/ha

20 Dose d'apport : 1 T/ha

Carbonate de calcium 1000 kg  
Dérivés d'ulvanes QSP 1000 g/ha  
Dose d'apport : 1 T/ha

25

b) AMENDEMENT ORGANIQUE ET SUPPORTS DE CULTURE

Terreau 500 kg  
Tourbe 500 kg

Dérivés d'ulvanes QSP 500 g/ha  
Dose d'apport : 1T/ha

### **B - ENGRAIS RACINAIRES**

5

#### a) ENGRAIS NP

Lithothamnium 310 kg

Chlorure de potassium 167 kg

Urée 161 kg

10 Sulfate d'ammoniaque 362 kg

Dérivés d'ulvanes QSP 200 g/ha

CULTURES	DOSE D'APPORT (kg/ha)
Pâtures	200 - 400
Céréales	
Maïs	

#### b) ENGRAIS NPK + MgO

15 Lithothamnium 158 kg

Phosphate d'ammoniaque 116 kg

Sulfate d'ammoniaque 186 kg

Urée 156 kg

Oxyde de magnésium 50 kg

20 Chlorure de potassium 334 kg

Dérivés d'ulvanes QSP 1000 g/ha

CULTURES	DOSE D'APPORT (kg/ha)
Maïs	400 - 800
Céréales	
Prairies	
Toutes cultures	

### **C - ENGRAIS FOLIAIRES**

25

#### a) SOLUTION Mg

Nitrate de Magnésium 50 kg

Eau 50 kg

Dérivés d'ulvanes

QSP 1 g/L (solution finale  
appliquée sur la plante)

CULTURES	Nombre d'apports à différents stades de la campagne	Dose par apport
Vergers	3 – 6	8 L/ha
Cultures maraîchères	2 – 6	5 – 8 L/ha

## 5 b) SOLUTION N Fe Mn

Nitrate de manganèse 15 kg

Chlorure ferrique 25 kg

Eau 60 kg

Dérivés d'ulvanes QSP 0,1 g/L (solution finale  
appliquée sur la plante)

10

CULTURES	Nombre de traitements	Dose par traitement
Vergers	4 – 6	3 – 6 L/ha
Cultures maraîchères	4 – 6	3 – 6 L/ha

## c) SOLUTION N Mn Zn

Nitrate de Manganèse 31 kg

15 Nitrate de Zinc 22 kg

Eau 47 kg

Dérivés d'ulvanes QSP 10 g/L (solution finale  
appliquée sur la plante)

CULTURES	Nombre d'apports	Dose par apport
Maïs	1 - 2	4 – 8 L/ha
Lin	1 - 2	4 – 8 L/ha
Betterave	1 – 3	4 – 8 L/ha
Soja	1 – 2	4 – 8 L/ha
Pomme de terre	1 – 3	4 – 8 L/ha
Haricots pois	2 - 3	4 – 8 L/ha

20

## d) SOLUTION NPK Oligoéléments

Urée 17 kg

Acide phosphorique 9 kg

	Potasse	9 kg
	Nitrate de Manganèse	0,7 kg
	Nitrate de Zinc	0,3 kg
	Nitrate de Cuivre	0,10 kg
5	Chlorure ferrique	0,20 kg
	Acide borique	0,4 kg
	Eau	63,3 kg
	Dérivés d'ulvanes	QSP 1 g/L (solution finale appliquée sur la plante)

10

CULTURES	Nombre d'apports	Dose par apport
Cultures maraîchères	5 – 10	4 – 6 L/ha
Vergers	4 – 6	4 – 6 L/ha

## e) SOLUTION B P K

	Potasse	8 kg
	Acide phosphorique	1 kg
15	Acide borique	1 kg
	Eau	90 kg
	Dérivés d'ulvanes	QSP 10 g/L (solution finale appliquée sur la plante)

CULTURES	Nombre d'apports	Dose par apport
Cultures maraîchères	2 – 4	3 – 5 L/ha
Cultures fruitières	3	5 L/ha

20

**D-SOLUTIONS NUTRITIVES RACINAIRES (HYDROPONIE, GOUTTE A GOUTTE)**

## a) SOLUTION NPK Mg

25	Nitrate de potassium	50 g/L
	Phosphate de potassium	27 g/L
	Sulfate de magnésium	49 g/L
	Dérivés d'ulvanes	200 g/L (i.e. 1g/L de solution finale appliquée sur la plante)

30

Dilution 1 L pour 200 L d'eau

b) SOLUTION N Ca Mg

Calcium nitrate

118 g/L

5 Chelate de fer

5 g/L

Dérivés d'ulvanes

100 g/L (i.e. 0,5 g/L de  
solution finale appliquée sur  
la plante)

10 Dilution 1 L pour 200 L d'eau



## **REVENDEICATIONS**

1. Utilisation des ulvanes, notamment extraits d'algues vertes du genre *Ulva* ou *Enteromorpha*, ou d'oligosaccharides dérivés d'ulvanes,  
5 comme éliciteurs des mécanismes d'absorption de l'azote et de la synthèse protéique.

2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les ulvanes précités sont extraits d'algues choisies dans le groupe constitué des espèces suivantes : *Ulva armoricana*, *Ulva rigida*, *Ulva rotundata*, *Ulva*  
10 *lactuca*, *Enteromorpha intestinalis* et *Entoromorpha compressa*.

3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les extraits précités sont obtenus par un procédé comportant généralement les étapes suivantes : lavage, broyage, extraction (séparation solide-liquide) et éventuellement fractionnement,  
15 concentration et déshydratation.

4. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les oligosaccharides dérivés d'ulvanes précités sont obtenus par hydrolyse acide ou enzymatique.

5. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les ulvanes ou oligosaccharides dérivés d'ulvanes sont apportés  
20 aux plantes :

- soit sous forme liquide par voie foliaire ou dans des solutions nutritives racinaires en une quantité de 0,1 à 100 g par litre, et de préférence de l'ordre de 1 g par litre,

25 - soit sous forme solide, par exemple, dans des engrais pulvérulents ou granulés en une quantité de 10 à 1000 g et de préférence de l'ordre de 200 g par hectare.

6. Procédé pour améliorer l'absorption d'azote et la synthèse protéique des plantes, caractérisé en ce qu'il comprend l'application  
30 auxdites plantes ou aux sols, d'une quantité efficace d'ulvanes, notamment extraits d'algues vertes du genre *Ulva* ou *Enteromorpha*, ou d'oligosaccharides dérivés d'ulvanes.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'application aux plantes est réalisée par voie foliaire ou par voie racinaire.

8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que les ulvanes ou oligosaccharides dérivés d'ulvanes précités sont utilisés en une quantité :

5       - de 0,1 à 100 g par litre, et de préférence de l'ordre de 1 g par litre pour les apports sous forme liquide par voie foliaire ou dans des solutions nutritives racinaires,

      - de 10 à 1000 g et de préférence de l'ordre de 200 g par hectare pour les apports sous forme solide, par exemple, dans des engrais pulvérulents ou granulés.

10       9. Produit fertilisant, caractérisé en ce qu'il comprend une quantité efficace d'au moins un ulvane, notamment extrait d'algues vertes du genre *Ulva* ou *Enteromorpha*, ou un oligosaccharide dérivé d'ulvane, éventuellement en association avec une ou plusieurs matières fertilisantes.

15       10. Produit fertilisant selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il se présente :

      - soit sous forme liquide et en ce qu'il contient une quantité d'ulvanes ou d'oligosaccharides dérivés d'ulvanes de 0,1 à 100 g par litre ;

20       - soit sous forme solide notamment sous forme de poudre ou de granulés et en ce qu'il contient une quantité d'ulvanes ou d'oligosaccharides dérivés d'ulvanes permettant un apport de 10 à 1000 g et de préférence de l'ordre de 200 g par hectare.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/FR2005/000764A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 A01N43/16 C05F11/00 C05F11/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A01N C05F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, BIOSIS, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	EP 1 437 334 A (UNIV DE LOS LAGOS) 14 July 2004 (2004-07-14) paragraphs '0012!, '0013! -----	1-10
X	BI F ET AL: "Studies on aqueous extracts of three algae as an elicitor of plant defence mechanism" PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, PAKISTAN BOTANICAL SOCIETY, KARACHI, PK, vol. 31, no. 1, 1999, pages 193-198, XP001204201 ISSN: 0556-3321 page 193, last paragraph - page 197, paragraph 1 ----- -/--	9,10



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \* & \* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 August 2005

Date of mailing of the international search report

16/08/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Marie, G

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/FR2005/000764

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>RAY B &amp; LAHAYE M: "Cell-wall polysaccharides from the marine green alga <i>Ulva "rigida"</i> (Ulvales, Chlorophyta). Extraction and chemical composition" CARBOHYDRATE RESEARCH, ELSEVIER SCIENTIFIC PUBLISHING COMPANY. AMSTERDAM, NL, vol. 274, 8 September 1995 (1995-09-08), pages 251-261, XP004021914 ISSN: 0008-6215 page 252, paragraph 2 - page 258</p>	9,10
X	<p>RAY B &amp; LAHAYE M: "Cell-wall polysaccharides from the marine green alga <i>Ulva "rigida"</i> (Ulvales, Chlorophyta). Chemical structure of ulvan" CARBOHYDRATE RESEARCH, ELSEVIER SCIENTIFIC PUBLISHING COMPANY. AMSTERDAM, NL, vol. 274, 8 September 1995 (1995-09-08), pages 313-318, XP004021920 ISSN: 0008-6215 page 314, line 10 - page 315, line 2</p>	9,10
X	<p>LAHAYE M &amp; RAY B: "Cell-wall polysaccharides from the marine green alga <i>Ulva "rigida"</i> (Ulvales, Chlorophyta) -- NMR analysis of ulvan oligosaccharides" CARBOHYDRATE RESEARCH, ELSEVIER SCIENTIFIC PUBLISHING COMPANY. AMSTERDAM, NL, vol. 283, 22 March 1996 (1996-03-22), pages 161-173, XP004018728 ISSN: 0008-6215 page 162, paragraph 2 page 163, paragraph 2</p>	9,10
X	<p>QUEMENER B. ET AL.: "Sugar determination in ulvans by a chemical-enzymatic method coupled to high performance anion exchange chromatography" JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, vol. 9, 1997, pages 179-188, XP002338773 page 180, paragraph 3 - page 185, paragraph 1</p>	9,10
A	<p>DATABASE BIOSIS 'Online! BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US; 1997, LOPEZ-MOSQUERA M E ET AL: "Effects of seaweed on potato yields and soil chemistry" XP002307444 Database accession no. PREV199799753675 abstract &amp; BIOLOGICAL AGRICULTURE AND HORTICULTURE, vol. 14, no. 3, 1997, pages 199-205, ISSN: 0144-8765</p>	1-10

### Information on patent family members

PCT/FR2005/000764

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No  
PCT/FR2005/000764

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE  
CIB 7 A01N43/16 C05F11/00 C05F11/10

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)  
CIB 7 A01N C05F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)  
EPO-Internal, BIOSIS, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
P, X	EP 1 437 334 A (UNIV DE LOS LAGOS) 14 juillet 2004 (2004-07-14) alinéas '0012!, '0013! -----	1-10
X	BI F ET AL: "Studies on aqueous extracts of three algae as an elicitor of plant defence mechanism" PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, PAKISTAN BOTANICAL SOCIETY, KARACHI, PK, vol. 31, no. 1, 1999, pages 193-198, XP001204201 ISSN: 0556-3321 page 193, dernier alinéa - page 197, alinéa 1 ----- -/--	9, 10

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

### ° Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- \*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- \*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- \*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- \*Z\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

2 août 2005

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

16/08/2005

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Marie, G

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	<p>RAY B &amp; LAHAYE M: "Cell-wall polysaccharides from the marine green alga Ulva "rigida" (Ulvaes, Chlorophyta). Extraction and chemical composition" CARBOHYDRATE RESEARCH, ELSEVIER SCIENTIFIC PUBLISHING COMPANY. AMSTERDAM, NL, vol. 274, 8 septembre 1995 (1995-09-08), pages 251-261, XP004021914 ISSN: 0008-6215 page 252, alinéa 2 - page 258</p>	9,10
X	<p>RAY B &amp; LAHAYE M: "Cell-wall polysaccharides from the marine green alga Ulva "rigida" (Ulvaes, Chlorophyta). Chemical structure of ulvan" CARBOHYDRATE RESEARCH, ELSEVIER SCIENTIFIC PUBLISHING COMPANY. AMSTERDAM, NL, vol. 274, 8 septembre 1995 (1995-09-08), pages 313-318, XP004021920 ISSN: 0008-6215 page 314, ligne 10 - page 315, ligne 2</p>	9,10
X	<p>LAHAYE M &amp; RAY B: "Cell-wall polysaccharides from the marine green alga Ulva "rigida" (Ulvaes, Chlorophyta) -- NMR analysis of ulvan oligosaccharides" CARBOHYDRATE RESEARCH, ELSEVIER SCIENTIFIC PUBLISHING COMPANY. AMSTERDAM, NL, vol. 283, 22 mars 1996 (1996-03-22), pages 161-173, XP004018728 ISSN: 0008-6215 page 162, alinéa 2 page 163, alinéa 2</p>	9,10
X	<p>QUEMENER B. ET AL.: "Sugar determination in ulvans by a chemical-enzymatic method coupled to high performance anion exchange chromatography" JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY, vol. 9, 1997, pages 179-188, XP002338773 page 180, alinéa 3 - page 185, alinéa 1</p>	9,10
A	<p>DATABASE BIOSIS 'Online! BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US; 1997, LOPEZ-MOSQUERA M E ET AL: "Effects of seaweed on potato yields and soil chemistry" XP002307444 Database accession no. PREV199799753675 abrégé &amp; BIOLOGICAL AGRICULTURE AND HORTICULTURE, vol. 14, no. 3, 1997, pages 199-205, ISSN: 0144-8765</p>	1-10

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

### Renseignements relatifs:

### ambres de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR2005/000764

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 1437334 A	14-07-2004	EP 1437334 A1	14-07-2004